

Aan:

Stuurgroep Wachttijden

Datum:

15 oktober 2020

Van:

Guus de Ruiter, Vektis

Betreft:

Kwartaalrapportage wachttijden ggz Q3 2020

1. Samenvatting landelijke beeld

In deze notitie staat een overzicht van de wachttijden per september 2020, afgezet tegen de wachttijden van juni 2018 en de tussengelegen periode. De wachttijden zijn bijgewerkt tot en met de aanleveringen van 30 september 2020.

Vanaf juni zijn de aanmeldwachttijden met tenminste een halve week gedaald bij 4 patiëntgroepen, waaronder bij drie groepen met lange wachttijden: persoonlijkheidsstoornissen en pervasieve stoornissen en eetstoornissen. De aanmeldwachttijden zijn licht gestegen bij 5 groepen, en bij 6 groepen minder dan 0,5 week veranderd.

De behandelwachttijden zijn tussen juni en september bij 6 stoornissen gestegen en bij 2 gedaald (ook hier weer bij eetstoornissen), vaak tegengesteld aan de trend in Q2.

Invloed van Corona?

De wachttijden worden door veel instellingen retrospectief bepaald over de patiënten die de 2 maanden daarvoor in zorg zijn gekomen. De wachttijden van juni tot en met september zeggen dus iets over de gemiddelde wachttijd van mensen die tussen april en september een intake hebben gehad / in zorg zijn gekomen.

In het begin van de corona-periode waren huisartsen minder goed bereikbaar en was het aantal verwijzingen lager, waardoor de aanmeldwachttijden wat lager waren in Q2. Aan het einde van Q2 konden weer meer mensen bij een huisarts terecht voor een verwijzing, waardoor in Q3 de aanmeldwachttijden over de gehele linie weer wat zijn toegenomen. De behandelwachttijden zijn in het derde kwartaal bij een groter aantal diagnosegroepen gestegen dan gedaald. Mogelijk als gevolg van uitval van behandelingen (als er klachten zijn die op corona kunnen wijzen).


2. Diagnosegroepen met een gemiddelde totale wachttijd boven de 14 weken

De diagnosegroepen met de langste wachttijden, en een gemiddelde totale wachttijd van afgerond 14 weken of meer zijn:

- pervasieve stoornissen (22 weken totaal; daling 1 week ten opzichte van juni 2020)
- persoonlijkheidsstoornissen (20 weken totaal; stijging 1 week)
- aandachttekort en -gedrag (16 weken; stijging 1 week)
- overige stoornissen kindertijd (15 weken; stijging 2 weken)
- restgroep diagnoses (15 weken; stijging 2 weken)
- angststoornissen (15 weken; stijging 1 week)
- eetstoornissen (13 weken; daling 3 weken).

Daarnaast is er een nog een opvallende daling van 2 weken is zichtbaar bij delirium/dementie (nu 12 weken). Bij verslaving aan overige middelen zijn de wachttijden met 1 week gedaald.

In totaal zijn er 4 diagnosegroepen waar de wachttijden zijn gedaald met afgerond minimaal een week, 2 waar de wachttijden minder dan een week afwijken ten opzichte van juni – hieronder valt ook de basis ggz, en 9 diagnosegroepen waar de wachttijden minimaal een week zijn gestegen.




In Bijlage 1 staan de wachttijdgegevens van iedere 3^e maand van het kwartaal weergegeven vanaf juni 2018.

Bijlage 2 geeft voor iedere regio weer hoe de wachttijden zich hebben ontwikkeld in de afgelopen 12 maanden voor 6 diagnosegroepen met lange wachttijden: pervasieve stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, aandacht tekort, angststoornissen, eetstoornissen en de restgroep diagnoses.

Aanmeldwachttijd boven de Treeknorm van 4 weken, behandelwachttijd binnen de norm van 10 weken

Een blijvende zorg zijn de aanmeldwachttijden; de wachttijd tot aan de eerste intake is over de gehele linie nog te groot. De kortste aanmeldwachttijd is 5 weken. De langste aanmeldwachttijden zijn 11 tot bijna 14 weken bij pervasieve stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en aandacht tekort.

De behandelwachttijd varieert van 3 tot bijna 10 weken en valt daarmee - als gemiddelde - onder de Treeknorm voor behandelwachttijd van 10 weken. Zie ook Bijlage 1.



Coronamaatregelen die vanaf maart zijn genomen in heel Nederland hebben zowel invloed op de behandelingen als op de instroom (minder verwijzingen).

De aanmeldwachttijden zijn - behalve bij persoonlijkheidsstoornissen en delirium/dementie - in juni lager dan in maart. Vanaf juni zijn de aanmeldwachttijden verder gedaald bij 4 patiëntgroepen, en licht gestegen bij 5 groepen, en bij 6 groepen minder dan 0,5 week veranderd.

Behandelwachttijden zijn in juni soms hoger (delirium / dementie, verslavingszorg, eetstoornissen, schizofrenie, stoornissen kindertijd) en soms lager dan in maart

(aandachttekort, bipolair, restgroep diagnoses). De wachttijden zijn tussen juni en september bij 6 stoornissen gestegen en bij 2 gedaald, vaak tegengesteld aan de trend in Q2.

Een mogelijke verklaring voor de wachttijd-veranderingen is dat er minder verwijzingen in Q2 waren vanuit de huisartsen, waardoor de aanmeldwachttijden wat konden dalen in die periode. Tegelijk is er zorg uitgevallen, waardoor de behandelwachttijden zijn opgelopen. Vanaf de tweede helft van Q2 waren de huisartsen weer veel beter bereikbaar, waardoor de verwijzingen weer zijn gestegen. Dit zou de hogere aanmeldwachttijden in Q3 verklaren. Er blijft druk op de behandelcapaciteit, door mogelijk verhoogde aanmeldcijfers in combinatie met uitval als gevolg van corona-achtige klachten.

	Aanmeldwachttijden			delta		Behandelwachttijden			delta	
	mrt	jun	sep	mrt-jun	jun-sep	mrt	jun	sep	mrt-jun	jun-sep
Basis GGZ	6,4	5,1	5,4	-1,3	0,3	3,2	2,9	3,0	-0,3	0,1
Aandachttekort en -gedrag	10,8	10,2	10,7	-0,7	0,5	5,5	4,8	5,2	-0,8	0,4
Alcohol gebonden	6,7	6,5	6,2	-0,2	-0,3	5,9	6,4	6,2	0,5	-0,1
Angst	9,1	8,7	8,6	-0,3	-0,1	5,7	5,5	6,1	-0,2	0,6
Bipolair en overig	8,0	6,9	6,7	-1,1	-0,2	5,2	4,0	5,8	-1,2	1,7
Delirium dementie en overig	4,7	5,3	6,3	0,6	1,1	5,3	8,7	5,6	3,4	-3,1
Depressie	8,2	7,5	7,5	-0,7	0,1	5,2	4,8	5,4	-0,3	0,5
Eetstoornissen	9,5	9,6	8,6	0,1	-1,1	7,5	8,2	6,1	0,7	-2,1
Overige aan middel gebonden stoornissen	6,6	6,6	5,6	0,0	-1,0	5,6	6,4	6,1	0,8	-0,3
Overige stoornissen kindertijd	9,6	7,8	7,5	-1,8	-0,3	4,8	5,5	7,6	0,7	2,1
Persoonlijkheid	10,2	11,2	10,6	1,0	-0,7	8,2	8,0	9,7	-0,2	1,7
Pervasief	14,8	14,4	13,5	-0,4	-0,9	8,7	8,3	8,4	-0,4	0,1
Restgroep diagnoses, andere aandoeningen	10,7	8,4	9,3	-2,3	0,8	6,9	5,1	5,8	-1,8	0,7
Schizofrenie	6,7	5,9	6,6	-0,7	0,6	4,1	4,9	5,2	0,8	0,3
Somatoforme stoornissen	6,9	5,3	6,0	-1,6	0,7	4,8	4,7	4,5	-0,1	-0,2

3. Regionale Hotspot

De regionale hotspot geeft een overzicht van de regio's en patiëntengroepen waar de wachttijden het kortst zijn (rechtsonder) en waar ze het langst zijn (linksboven).

Som van aandoenk- en behandelwachtijd samen	Pervasiof	Persoonlijkheid	Aandachttekort en -gedrag	Overige stoornissen kinderj	Angst	Restgroep diagnoses, andere aandoeningen	Eetstoornissen	Depressie	Bipolair en overig	Overige aan middel gebonden stoornissen	Alcohol gebonden	Schizofrenie	Somatoforme stoornissen	Delirium, dementie en overig	Basal GGZ
ROTTERDAM	30,1	44,5	11,7	23,0	17,6	20,3	24,9	16,1	31,8	23,0	28,5	60,7	7,2	17,6	9,5
GRONINGEN	26,9	21,0	23,3	17,3	18,7	30,9	20,1	16,4	17,9	19,5	19,6	21,8	18,2	15,0	9,5
WAARDENLAND	17,2	16,6	12,0	16,2	11,2	17,0	28,8	13,7	17,8	31,3	32,0	16,3	8,7	12,2	7,5
ZUID-LIMBURG	29,7	23,7	27,3	10,7	17,4	17,9	11,5	14,0	17,9	20,1	18,9	15,2	9,0	8,8	8,2
UTRECHT	16,5	26,2	14,5	33,0	16,5	13,2	17,2	12,6	15,5	14,0	12,7	6,3	19,0	19,8	6,4
DRENTHE	35,0	21,4	18,4	11,6	19,8	23,3	16,8	14,4	13,9	8,1	8,1	12,2	12,1	9,8	12,6
ARNHEM	25,1	17,6	16,6	23,8	13,2	17,6	22,2	15,4	13,3	11,3	12,1	11,8	8,9	11,1	9,3
ZEELAND	15,7	14,5	23,0	27,3	12,7	20,0	10,0	11,5	21,8	18,9	18,7	13,8	9,6	3,0	6,8
MIDDEN-BRABANT	39,9	20,6	23,4	14,8	15,8	11,2	10,6	14,4	17,4	10,8	10,0	8,6	15,8	0,0	7,8
T GOOI	26,8	19,8	15,1	17,7	15,8	16,1	19,9	17,0	14,2	5,3	5,3	10,8	13,4	10,9	11,1
FLEVOLAND	21,6	16,6	24,2	27,4	17,6	12,5	1,0	11,2	19,2	8,6	8,4	8,1	9,8	16,0	11,8
NIJMEGEN	18,7	19,9	14,9	30,3	13,4	13,2	19,8	11,4	10,3	16,4	16,0	5,6	8,6	7,8	7,1
NOORDOOST BRABANT	23,8	23,1	16,2	4,1	19,0	10,7	15,2	19,8	12,9	9,4	9,0	7,9	10,4	22,3	7,5
Landelijk totaal	22,0	20,3	15,8	15,1	14,7	15,1	14,7	12,9	12,5	11,7	12,4	11,7	10,5	11,9	8,4
WESTLAND SCHIEDLAND EN DELFLAND	16,6	13,6	15,7	42,0	12,8	13,5	6,0	12,2	6,8	20,0	13,0	11,2	11,3	4,5	7,6
ZUIDOOST-BRABANT	34,9	14,9	14,2	15,1	13,8	9,2	9,0	12,1	7,1	15,7	16,9	13,6	5,9	13,4	7,7
APELDOORN/ZUTPHEN E.O.	17,4	13,1	16,9	17,5	16,8	13,0	28,6	12,0	7,7	7,0	6,0	12,2	12,7	13,1	9,0
AMSTERDAM	13,0	21,2	16,5	12,9	14,6	19,5	17,6	13,2	13,3	6,7	7,9	11,7	11,7	8,2	8,9
IZWOLLE	23,0	20,7	14,9	16,4	16,3	14,9	13,6	14,6	9,6	6,4	7,3	4,0	13,8	9,7	8,7
MIDDEN-JUSSEL	29,4	23,2	28,7	11,2	16,4	10,3		16,6	6,6	6,6	6,0	5,4	10,5	10,0	7,4
TWENTE	26,8	18,9	26,3	6,6	12,9	11,7	7,0	12,5	6,9	10,0	9,4	10,8	6,3	11,3	7,8
WEST-BRABANT	12,1	19,2	20,5	13,8	13,5	16,5	10,9	11,6	7,2	12,3	12,4	4,6	7,0	3,0	10,5
NOORD-LIMBURG	14,6	18,2	13,5	7,8	15,7	12,3	18,0	13,1	13,6	7,7	7,1	8,3	7,1	7,0	9,4
ZUID-HOLLAND NOORD	17,8	16,2	16,3	19,0	15,6	11,1	13,1	9,1	5,6	6,0	9,5	7,6	11,1	6,8	7,8
KENNEMERLAND	34,0	14,7	11,2	11,7	13,0	23,3	8,8	4,2	7,4	5,9	4,5	8,3	10,6	8,0	
ZAANSTREEK/WATERLAND	12,9	17,2	12,0	7,6	13,4	15,9	12,5	13,0	4,9	9,4	7,4	8,4	6,6	13,4	10,1
AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN	9,4	17,6	13,2	16,3	10,7	13,4	6,2	11,0	14,7	7,9	2,5	6,7	9,0	13,0	10,1
MIDDEN-HOLLAND	26,2	12,7	9,7	17,4	11,2	5,8	6,0	11,7	10,5	6,0	8,0	3,6	18,1	3,0	9,0
HAAGLANDEN	11,8	14,7	14,7	10,9	11,0	9,2	15,6	10,1	8,5	6,0	4,6	9,1	7,9	2,2	8,8
FRIESLAND	11,3	11,0	8,7	5,9	11,5	11,3	12,3	8,6	8,6	12,0	12,6	4,7	8,0	3,5	8,6
ZUID-HOLLANDSE EILANDEN	9,7	13,0	6,7	10,8	9,9	7,2	2,0	10,3	12,2	10,9	9,8	10,8	6,7	10,8	5,7
NOORD HOLLAND NOORD	8,9	9,7	10,4	11,3	11,0	10,0	8,6	10,5	9,1	5,8	6,9	9,1	8,2	2,0	6,2

Tabel: hotspotrapportage september 2020.

Regionaal beeld

De 5 regio's met de langste wachttijden zijn in juni:

Rotterdam, Groningen, Waardenland, Zuid Limburg en Utrecht. Utrecht stond in maart niet in de bovenste 5 regio's, toen stond 't Gooi daar nog.

Regio's met de kortste wachttijden zijn Noord-Holland-Noord, Zuid-Hollandse Eilanden, Friesland, Haaglanden, Midden Holland. Haaglanden is in de top 5 gekomen in plaats van Noord-Limburg.

Trend van de regionale gemiddelde wachttijden.

De regionale ontwikkeling (trend) van de totale wachttijden van de aandoeningen met lange wachttijden zijn in Bijlage 2 opgenomen voor alle regio's en landelijk gemiddeld.

Instellingen en zorgverzekeraars kunnen een rapportage op Zorgprisma gebruiken waarmee de ontwikkeling van de totale wachttijd kan worden gevolgd per diagnose en per instelling of per regio.

Regionale verdieping naar aanbieders

Datum:
15 oktober 2020


Betreft:
Kwartaalrapportage Wachttijden GGZ Q2 2020

5/26

Analoog aan bovenstaande hotspot-rapportage met regio's is er een verdiepend rapport met alle zorgaanbieders per regio. Dit bestand is raadpleegbaar via Zorgprisma en wordt ook als PDF opgeleverd en gedeeld op de website wegvandewachttijst.nl en de publieke website van Vektis (vektis.nl), zodat het voor alle regionale taskforces beschikbaar is.

4. Aanleveringen en aanmeldstops

Aanleveringen



Het aantal instellingen dat aanlevert is stabiel. Het volumeaandeel van alle aanleverende instellingen is 95%. Bij vrijgevestigden is dat 74%.

Aanmeldstops

Van de zorgaanbieders die wachttijden aanleveren, heeft een deel aangegeven een gehele of gedeeltelijke aanmeldstop te hebben. Een gedeeltelijke stop kan slaan op een deel van de vestigingen, alleen voor basis ggz of specialistische ggz, of voor een aantal verzekeraars. In de meeste gevallen zijn aanmeldstops volledige aanmeldstops.


Bij instellingen zijn er relatief weinig aanmeldstops. Bij 11% van de instellingen is er enige vorm van aanmeldstop, waarvan 4% volledig. Het marktaandeel van instellingen met een vorm van aanmeldstop is 6%.

Voor vrijgevestigden heeft ongeveer een derde van de zorgaanbieders een vorm van aanmeldstop. 22% van de capaciteit (marktaandeel) heeft te maken met een volledige aanmeldstop.

	Instellingen		Vrijgevestigden	
	Gehele aanmeldstop	Enige vorm van aanmeldstop	Gehele aanmeldstop	Enige vorm van aanmeldstop
% van aantal aanbieders	4%	11%	29%	34%
% van marktaandeel	0%	6%	22%	30%

Bijlage 1. Wachttijden per kwartaal

Het overzicht hieronder geeft de gemiddelde wachttijden weer in juni 2018 en de 3^e maand van de laatste 5 kwartalen.



	Gemiddelde wachttijden (weken) per kwartaal (landelijk)													
	jun-18		sep-19		dec-19		mrt-20		jun-20		sep-20		verschil laatste Q (weken)	
	Aanmeld	Totaal	Aanmeld	Totaal	Aanmeld	Totaal	Aanmeld	Totaal	Aanmeld	Totaal	Aanmeld	Totaal	Aanmeld	Totaal
Basis GGZ	5,5	8,7	5,4	8,5	5,6	8,8	6,4	9,6	5,1	8,0	5,4	8,4	0,3	0,4
Aandachttekort en -gedrag	8,4	12,9	9,8	16,4	10,0	15,7	10,8	16,4	10,2	14,9	10,7	15,9	0,5	0,9
Alcohol gebonden	4,5	9,0	5,6	10,5	6,2	11,6	6,7	12,6	6,5	12,8	6,2	12,4	-0,3	-0,4
Angst	7,5	12,2	7,8	13,7	8,9	14,8	9,1	14,8	8,7	14,2	8,6	14,7	-0,1	0,5
Bipolair en overig	6,0	10,6	7,2	11,6	7,4	12,9	8,0	13,2	6,9	10,9	6,7	12,5	-0,2	1,5
Delirium dementie en overig	4,1	8,1	4,9	9,7	5,8	10,3	4,7	10,0	5,3	14,0	6,3	11,9	1,1	-2,0
Depressie	6,9	11,1	7,1	12,1	7,8	13,2	8,2	13,3	7,5	12,3	7,5	12,9	0,1	0,6
Eetstoornissen	7,2	12,1	9,1	17,0	7,7	13,0	9,5	17,1	9,6	17,8	8,6	14,7	-1,1	-3,1
Overige aan middel gebonden stoornissen	4,8	9,4	5,7	10,9	6,4	11,7	6,6	12,2	6,6	13,0	5,6	11,7	-1,0	-1,3
Overige stoornissen kindertijd	7,1	12,9	7,4	12,5	7,8	13,6	9,6	14,5	7,8	13,3	7,5	15,1	-0,3	1,8
Persoonlijkheid	8,0	16,1	10,7	20,0	10,2	18,0	10,2	18,4	11,2	19,2	10,6	20,3	-0,7	1,0
Pervasioef	9,5	16,7	12,9	21,5	13,5	22,3	14,8	23,6	14,4	22,7	13,5	21,9	-0,9	-0,8
Restgroep diagnoses, andere aandoeningen	7,8	14,2	12,5	18,3	12,7	17,8	10,7	17,6	8,4	13,5	9,3	15,1	0,8	1,6
Schizofrenie	6,5	10,7	8,0	12,2	6,0	9,5	6,7	10,8	5,9	10,8	6,6	11,7	0,6	0,9
Somatoforme stoornissen	5,1	9,3	5,8	10,9	5,5	10,7	6,9	11,7	5,3	10,0	6,0	10,5	0,7	0,6

Tabel. Gemiddelde wachttijden (in weken) per patiëntgroep, aanmeldwachttijd en totale wachttijd. De laatste kolommen geven het verschil weer tussen de aanmeld- en totale wachttijd in juni 2020 en september 2020.

Bijlage 2. Trend in de regionale wachttijden


In deze bijlage staan per regio de gemiddelde totale wachttijden voor de volgende 6 diagnosegroepen met hoge wachttijden in Nederland, in juni 2020:

- pervasieve stoornissen
- persoonlijkheidsstoornissen
- restgroep diagnoses
- eetstoornissen
- aandachttekort en -gedrag
- angststoornissen.

De regionale wachttijden zijn voor de laatste 12 maanden weergegeven, zodat te zien is hoe de wachttijden zich van maand op maand ontwikkelen.

De landelijke trend staat hieronder. De stippellijn geeft de Treeknorm aan: de totale wachttijd zou onder de 14 weken moeten liggen.

De horizontale as geeft de maand aan waarin de wachttijden zijn aangeleverd.



Op de volgende pagina's staan de grafieken van de 31 regio's (in alfabetische volgorde), zonder verdere toelichting. De verticale as is in bijna alle regio's gemaximeerd op 35 weken, zodat de grafieken goed vergelijkbaar zijn.

